

**ГЛАЗЦЕНТР**  
МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА

НОВОЕ ЗРЕНИЕ  
**В HD  
КАЧЕСТВЕ**

**8UHD**

**18+**

# Подготовка к диагностике и операции перед лазерной коррекцией зрения (Lasik)

Предоперационное обследование включает:  
автотрефрактометрию, кератотопографию, визометрию,  
бесконтактную тонометрию, биомикроскопию,  
ультразвуковое исследование (при необходимости).


## Что с собой иметь на диагностику:

- паспорт
- солнцезащитные очки
- бумажные салфетки

- В день диагностики и операции вы должны прийти  **здоровым и сытым**.
- Для проведения качественной диагностики необходимо  **воздержаться от ношения контактных линз** в течение 10-14 суток. Необходимо  **воздержаться от ношения жестких ночных линз** за 6 месяцев.
- За двое суток до обследования и операции  **нельзя употреблять алкогольные напитки**.
- В день диагностики и операции  **не применять косметику** для глаз. В день операции необходимо прийти  **без нарощенных ресниц**, не применять любые парфюмированные средства.
- Обязательно иметь с собой  **солнцезащитные очки**.
- Не приезжать на процедуры за рулем** собственного авто. Вести автомобиль после обследования и операции может быть затруднительно.
- Накануне операции нужно умыться, уделив особое внимание  **гигиене глаз, вымыть волосы**.
- Если накануне операции у вас появились температура, насморк, кашель, герпетические высыпания на носу и губах, заболел зуб,  **операцию следует перенести**. Операцию можно проводить как минимум спустя 10-14 дней после полного выздоровления.
- На операцию лучше прийти в  **свободной одежде** без воротника.

**Вес пациента не должен превышать 110 кг**

# **После проведения диагностики необходимо сдать предоперационные анализы.**



- ОАК (общий клинический анализ крови)
- СОЭ (скорость оседания эритроцитов)
- Сахар крови (глюкоза)
- ЭДС (экспресс-диагностика на сифилис)
- ВИЧ
- Маркёры гепатита В и С

**Флюорографию нужно иметь с собой**

**Ульяновск  
Краснодар**

Срочные анализы обычно готовятся в течение дня или на следующий день

**Санкт-  
Петербург**

Срочные анализы обычно готовятся в течение 2-3 дней

**Екатеринбург**

Срочные анализы обычно готовятся на следующий день



# Во время проведения диагностики и операции по лазерной коррекции зрения необходимо выполнять все указания врача!

**При обращении в клинику вы должны иметь следующее:**

- ✓ Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
- Подлинные результаты анализов с печатью и подписью врача: ВИЧ, маркеры Гепатитов В и С – срок действия анализов 3 месяца; ЭДС (сифилис) 1 месяц; ОАК, СОЭ сахар крови – срок действия анализов 2 недели; флюорографию с отметкой "в норме"/"без патологии" – срок действия 1 год\*
- ✓ Обезболивающие таблетки, глазные капли.
- ✓ Солнцезащитные очки.

**Перед операцией приобрести и начать самостоятельно закапывать следующие препараты:**

**Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург**

1. Вигамокс 4 раза в день за 1-2 дня до операции.

**Ульяновск**

Сигницеф 0,5% за сутки до операции 4 раза

2. Увлажняющие капли 4 раза в день (при возможности за 7 дней до операции) на выбор: Хило-Комод, Оптинонол мягкое восстановление, Гилан ультра комфорт, Теалоз Дуо, Стиллавит и пр.

3. Дексаметазон 0,1% (закапывание начинать после операции!)

**За 2 дня до операции исключить алкоголь, не использовать декоративную косметику!**

Ваши зрительные функции будут восстанавливаться постепенно. Первые 2-3 месяца возможны значительные колебания остроты зрения даже в течение дня.

Когда действие обезболивающих капель, которые закапываются во время операции, закончится (через 20-40 минут после операции), у вас появится слезотечение, светобоязнь и ощущение инородного тела в глазу. Эти симптомы у разных людей могут быть выражены в разной степени: от незначительных, не причиняющих дискомфорта, до интенсивных. В случае выраженных болевых ощущений вы можете принять обезболивающий препарат, приобретенный заранее.



**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** При положительных маркерах гепатитов В и С и ВИЧ необходимо заключение врача инфекциониста об отсутствии противопоказаний для проведения операции методом lasik. При положительном ЭДС и отклонениях в ОАК, СОЭ – допуск от врача терапевта, в сахаре крови – от эндокринолога. Если все анализы в норме, то допуски не нужны.

**Вес пациента не должен превышать 110 кг**

# ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

В первые дни после операции у вас могут отмечаться симптомы: слипающиеся по утрам веки, светобоязнь, слезотечение, двоение, ощущение «песка» в глазах. Не беспокойтесь, это временные явления. Отдых и сон помогут уменьшить неприятные ощущения.

Ваши зрительные функции будут восстанавливаться постепенно. Первые 2-3 месяца возможны значительные колебания остроты зрения даже в течение дня. Необходимо проходить плановый осмотр через 6 месяцев и через год после операции Lasik (можно у врача-офтальмолога по месту жительства).

## Желаем вам скорейшего выздоровления!



Запрещается трогать глаза.



Нельзя умываться и мыть голову первые три дня после операции. Лицо протирать влажной салфеткой, не касаясь глаз. На четвертый день можно волосы мыть, запрокинув голову назад, очень аккуратно, чтобы мыльная пена не попадала в глаза.



Следует ограничить контакт с домашними животными и маленькими детьми. В течение двух недель исключить грубое механическое воздействие на глаза и возможность их травмирования.



Две недели избегать перегревания, переохлаждения и попадания холодного воздуха в глаза, чтобы исключить простудные заболевания.



Сократить общее время чтения, работы за компьютером и просмотра телепередач (суммарно не более двух часов). Далее нагрузки на глаза увеличивать постепенно.



Отказаться от планирования беременности первые 6 месяцев после операции.



Отказаться на время от занятий активными видами спорта. В течение двух недель соблюдать осторожность при прогулках, чтобы непреднамеренно не повредить роговицу.



Согласовать с врачом занятия другими видами спорта.



Исключить употребление алкогольных напитков в течение месяца после операции.



Запрещается посещать сауну или баню в течение одного месяца, не разрешается купаться в открытых водоемах или в бассейне в течение одного месяца.



Через один месяц после операции можно возобновить занятия спортом (легкая атлетика).

## Как вести себя в первый день после операции Lasik



Не прикасаться к глазам и векам, не сжимать глаза!



После операции рекомендуется выпить обезболивающий препарат (тот, который вы обычно принимаете от головной боли). Неприятные ощущения пройдут через 3-4 часа.



Через 1 час после операции закапать Вигамокс, Дексаметазон 0,1% (Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург) Сигницеф 0,5% (Ульяновск) и увлажняющие капли (интервал между препаратами 5 минут), затем каждые 2 часа до сна. Ночью просыпаться для закапывания капель не нужно.



Спать только на спине! Для большей безопасности можно спать в очках.



На следующий день утром не умываться, закапать Вигамокс, Дексаметазон 0,1% (Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург), Сигницеф 0,5% (Ульяновск), увлажняющие капли и прийти на осмотр в клинику.

Дальнейшие рекомендации доктор даст на осмотре.

### Необходимые для проведения обследования документы:



Документ, удостоверяющий личность (паспорт).



Результаты обследования зрения, выданные другими офтальмологическими клиниками (если есть).

# **Пожалуйста, ознакомьтесь**

## **Ряд противопоказаний к лазерной коррекции зрения**

Аутоиммунные болезни, затрудняющие нормальную регенерацию роговицы;  
Патология иммунитета;  
Сахарный диабет  
Повышенное внутриглазное давление;  
Прогрессирующий кератоконус или прогрессирующая миопия, возрастная пресбиопия;  
Малая толщина роговичной оболочки (менее 450 мкм);  
Непрозрачность оптических средств (роговицы, хрусталика);  
Саркоидоз легких 2 степени;  
Киста щитовидной железы;  
Туберкулез;  
Атрофия зрительного нерва;  
Повышенная температура;  
Эпизиндром;  
Миастения;  
Ихтиоз;  
Центральная серозная хориоретинопатия;  
Эпилепсия;  
Антифосфолипидный синдром;  
Васкулопатия;  
Рассеянный Склероз;  
Красный плоский лишай;  
Гнойный дакриоцистит;  
Отслойка сетчатки;  
Нистагм;  
Вирусное поражение глаз (герпес);  
Состояние беременности и период лактации.  
Вес пациента не должен превышать 110 кг

\*Лазерная коррекция не рекомендована к проведению до 18 лет, в связи с незаконченным формированием глазного яблока.

**С полным списком противопоказаний можно ознакомиться на сайте:**



**Все противопоказания рассматриваются индивидуально, и оцениваются относительно их стадии и сложности протекания. В некоторых случаях необходимы заключение специалистов (см. ниже)**

**Решение о допуске/недопуске к операции принимается исключительно врачом-офтальмологом после прохождения предоперационной диагностики**

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!** При положительных маркерах гепатитов В и С и ВИЧ необходимо заключение врача инфекциониста об отсутствии противопоказаний для проведения операции методом lasik. При положительном ЭДС и отклонениях в ОАК, СОЭ - допуск от врача терапевта, в сахаре крови - от эндокринолога. Если все анализы в норме, то допуски не нужны.



# **Риски (временные «осложнения») процесса восстановления после лазерной коррекции зрения**

- **Ощущение инородного тела в глазу** может доставлять дискомфорт в течение нескольких дней после прохождения процедуры лазерной коррекции.
- **Слезотечение** может наблюдаться в течение нескольких дней после операции.
- **Синдром «сухого глаза»** – временный симптом, при возникновении которого необходимо увлажнять глаз специальными каплями, рекомендованными лечащим врачом.
- **Двоение, нечеткость изображения** может наблюдаться в первые часы после операции.
- **Повышенная чувствительность к яркому свету**, как правило, доставляет особенный дискомфорт в первые дни после процедуры.
- **Ухудшение зрения в условиях слабой освещенности:** в сумерках, ночью, – может беспокоить в течение нескольких недель или месяцев после лазерной коррекции.
- **Повышение внутриглазного давления**
- **Субконъюнктивальная гематома (синяк)** может возникнуть после вакуумного кольца
- **Временное колебание остроты зрения и гало-эффект** в течение нескольких месяцев
- **Дислокация лоскута (смещение)** в результате незначительного механического воздействия
- **Болевой синдром** в течение нескольких дней
- **Послеоперационное инфицирование** может наступить в результате пренебрежения противомикробными каплями, которые необходимо капать в течение первой недели.
- **Гипер- и гипокоррекция желаемой остроты зрения** (ретрогress близорукости, дальнозоркости, астигматизма)
- **При наступлении возрастной дальнозоркости (как правило это наступает в период 38-45 лет, в зависимости от запаса аккомодации) могут понадобиться очки для чтения.**

## **Правила подготовки к диагностическим исследованиям**

- **На прием к офтальмологу следует приходить без косметики, без теней для век и туши для ресниц.**
- **В день приема у офтальмолога избегайте вождения автомобиля.**  
Вполне возможно, что на приеме Вам потребуется расширение зрачка (закапывание специальных капель). Такая манипуляция – противопоказание для вождения автомобиля.
- **Если у Вас очень плохое зрение, то желательно прийти с сопровождающим.**
- **Если Вы ранее проходили лечение в другом медицинском учреждении запишите препараты, которые Вы применяли.**
- **Если ранее вам выполнялись обследования зрительной системы и их результаты есть у вас на руках, возьмите их с собой.**




# Надежная сеть офтальмологических клиник в России

   glazcentre

5 •  
клиники в России

5 •  
диагностических  
центров

2 •  
консультационных  
центра



**8 800 70 70 616**

[help@glazcentre.ru](mailto:help@glazcentre.ru)